

Retentie

De belangrijkste fase begint nu: mooi houden!

Vandaag hebben we de orthodontische apparatuur bij u, uw zoon of dochter verwijderd.

Nu de apparatuur is verwijderd kan het tandvlees wat gevoelig en rood zijn met mogelijk een lichte bloeding. Dit komt vaak voor, maar verdwijnt meestal vanzelf na een aantal dagen.

Er is een gecementeerde retainer geplaatst om de stand van de tanden te handhaven. Het is het beste om deze draad zo lang mogelijk te laten zitten.

Bel ons zo spoedig mogelijk voor een afspraak indien U of Uw kind problemen heeft met het draadje, of wanneer er iets los gaat zitten. Wees gewaarschuwd wanneer er een stukje cement/lijm vanaf komt.



Indien het draadje los komt, kan de stand van de tanden snel veranderen, welke door de orthodontische behandeling verbeterd waren. Zeker als de beugel er net uit is, is het erg belangrijk om het draadje zo snel mogelijk weer vast laten zetten.

Wanneer het draadje volledig loskomt, dit draadje voorzichtig bewaren (niet verbuigen) in een enveloppe en meenemen bij de afspraak, zodat wij deze kunnen terugplaatsen. Dit draadje wordt speciaal op een gipsmodel door de tandtechnieker gebogen.

Ook na het verwijderen van de slotjesbeugel, blijft het verzorgen van het gebit erg belangrijk. Door het plaatsen van een retainer achter de tanden, is het noodzakelijk om een tandenstoker of speciaal flossdraad te gebruiken om ook daar de tanden goed te reinigen.

Mocht de retainer loskomen: Wij hebben tijd nodig (een langere afspraak) om de draad weer vast te zetten!

samenvatting retentie

- * Het kan wat gevoelig zijn, maar dat gaat na een paar dagen alweer over.
- * Vermijd plakkerig en hard eten zolang de draad in de mond zit.
- * Bij losraken van het draadje meteen contact opnemen: je tanden kunnen snel van stand veranderen